

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



特 許 願

昭和58年11月15日

特許庁長官 殿

1 発明の名称
ユウドウタイ セイカウ
ポリリン誘導体の製法

2 発 明 者
オオサガヒサシロシロシロシロシロ
大阪府大阪市東住吉区番屋町1の102
前 田 豊 三 (ほか1名)

3 特許出願人 郵便番号 554
オオサガヒサシロシロシロシロシロ
大阪府大阪市東区道修町3丁目1番地
(192) 雄野製薬株式会社
代表者 古 利 一 雄

4 代 理 人 郵便番号 555
大阪市福島区荒洲上3丁目47番地
雄野製薬株式会社特許部(電話06-638-5861)
弁理士(4703) 岩 崎 光

5 添付書類の目録

- (1) 明 細 書 / 通
(2) 委 任 状 / 通
(3) 願 書 副 本 / 通

明 細 書

1 発明の名称
ポリリン誘導体の製法


2 特許請求の範囲

一般式



〔式中、 X_1 および X_2 はそれぞれ水素、アルキル基または両者が結合して形成する脂環もしくは芳香環を表わし、 W はハロゲンまたは2位もしくは4位を置換するニトロ基を表わし、 Z は加水分解により CH_2COOH (但し R は水素またはアルキル基を表わす。)になる基を表わす。〕で示される化合物またはその β -オキシドを

一般式



〔式中、 A は酸素または硫黄を表わし、 $Y_1, Y_2,$

① 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 50-77375

④公開日 昭50.(1975) 6.24

②特願昭 48-128453

②出願日 昭48.(1973) 11.15

審査請求 未請求 (全6頁)

庁内整理番号

7306 44
7043 44

②日本分類


16 E431
30 B4

⑤ Int. Cl²

C07D213/62
C07D213/89
C07D215/20
C07D215/36
A61K 31/44
A61K 31/47

および Y_2 はそれぞれ水素、アルキル基、アルコキシ基、カルバモイル基、カルボキシ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、トリフルオロメチル基、水酸基、アシルオキシ基、アシルアミノ基またはハロゲンを表わし、これらの任意の2置換基は結合して脂環または芳香環を形成してもよい。〕で示される化合物を反応させて

一般式





〔式中、 $X_1, X_2, Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, A$ および Z は前記と同意義を表わす。〕で示される化合物またはその β -オキシドを得るかあるいは必要に応じて加水分解に付して対応するカルボン酸を得ることを特徴とするポリリン誘導体の製法。

3 発明の詳細な説明

本発明はポリリン誘導体の製法に関し、その目的は優れた抗炎症作用(抗リウマチ作用を含む)、および鎮痛作用を示し、医薬あるいはその合成中

固体として有用なポリリン誘導体を得る点にある。

本発明方法の要旨はニトロもしくはハロゲンポリリン誘導体またはそのエーオキサイドにフェニル化合物またはチオフェニル化合物を反応させてフェノキシポリリン誘導体またはチオフェニルポリリン誘導体あるいはそれらのエーオキサイドを得る点にあり、下記の一般式によつて示される。



〔式中、 Y_1 および Y_2 はそれぞれ水素、アルキル基または両者が結合して形成する脂環もしくは

たはそれらのエーオキサイド〔I〕を得ることを目的とする。

本発明方法の原料ポリリン誘導体またはそのエーオキサイド〔II〕は加水分解によりカルボキシメチル基またはα-アルキルカルボキシメチル基となる基（例えば、それぞれのカルボン酸に対応するニトリル、アミド、エステルなど）を有しており、かつ同一または相異なる1〜2個のアルキル基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソブチルなど）で置換されているもよいし、さらにそのポリリン環はベンゼン環のような芳香環またはクロベンチル環もしくはシクロヘキシル環のような脂環と結合しているもよい。反応させるフェニル化合物〔III〕はアルキル基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソブチルなど）、アルコキシ基（例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシなど）、カルバモイル基、カルボキシ基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、トリフルオロメチル基、水酸基、アレルオキシ基（例えば、アセチルオキシ、プロピオニルオキシ、ブ

チルオキシなど）、アレルアミノ基（例えば、アルキルアレルアミノ、無機炭酸アレルアミノ、アリールアレルアミノなど）およびハロゲン（例えば、塩素、臭素など）から選ばれる同一または相異なる1〜3個の置換基を有しているもよい。またそのベンゼン環に結合しているもよい芳香環としてはベンゼン環が脂環として例えばシクロペンチル環またはシクロヘキシル環がそれぞれ例示される。

すなわち、本発明方法は加水分解によりカルボキシメチル基またはα-アルキルカルボキシメチル基となる基を有しており、かつハロゲン（例えば、臭素、塩素など）で置換されているかまたは2位もしくは4位にニトロ基を有するポリリン誘導体またはそのエーオキサイド〔II〕にフェニル化合物〔III〕、すなわちフェニル類またはチオフェニル類を反応させてフェノキシポリリン誘導体もしくはチオフェニルポリリン誘導体ま

たはそれらのエーオキサイド〔I〕を得ることを目的とする。

本発明方法は塩基性物質（例えば、水素化アルカリ、水酸化アルカリ、炭酸アルカリ、炭酸水素アルカリ、酢酸アルカリなど）の存在下あるいは不存在下にポリリン誘導体またはそのエーオキサイド〔II〕にフェニル化合物〔III〕を結合させることにより実施される。反応は通常無溶媒下あるいは不活性溶媒（例えば、ポリリン、シメチルホルムアミド、シメチルアセトアミド、シメチルスルホキシド、ニトロベンゼン、メタノール、エタノールなど）中、室温ないし溶媒の沸点程度の温度において実施される。なお、フェニル類が反

応に供される場合には触媒として酸化第二銅、銅粉などの金属触媒を使用して反応を促進することとを考慮してもよい。また液状の原料化合物の場合は反応溶媒と兼ねて用いることも可能である。

上記反応工程により得られたピリジン誘導体およびそのγ-オキシド〔I〕はさらに必要に応じて加水分解に付される。ここで行われる加水分解はニトリル化合物、アミド化合物またはエステル化合物を対応するカルボン酸に変換する際に通常用いられる方法を踏襲して行われればよく、水またはその他の含水溶媒中、酸（例えば、塩酸、硫酸、臭化水素酸、酢酸など）またはアルカリ（例えば、水酸化アルカリ、炭酸アルカリ、炭酸水素アルカリなど）を用いて室温または加熱下に行われる。なお、原料物質としてγ-オキシドを使用しながら、γ-オキシドを目的化合物としない場合には各工程の前段で適宜還元し対応するピリジン誘導体に変換することを考慮すればよい。

かくして得られたピリジン誘導体またはそのγ-オキシドはさらに分離、精製または製剤化の

間反応させる。冷却後、ハイフロスーパーセル/脱色炭を用いてろ過し、残渣をベンゼンで洗滌。洗液とろ液を合する。溶媒を留去後、残渣をベンゼンに溶解し、10%水酸化ナトリウム水溶液および水で洗滌後乾燥し溶媒を留去する。残渣1.1gはシリカゲルカラムクロマトに付しヘキサン/ベンゼン（1:1）〜ベンゼン溶出部より油状のエチル2-(6-フェノキシ-3-ピリジル)プロピオネート2.6gを得る。

本品を20%水酸化カリウム水溶液5.3mlとエタノール5.3mlの混液に溶解し室温で3時間かきまぜた後溶媒を留去する。残渣に水を加えて溶解した後塩酸々性とし次いで炭酸水素ナトリウムでアルカリ性とし、クロロホルムおよびエーテルで洗滌する。脱色炭で処理後塩酸でpH3としエーテルで抽出する。抽出液を水洗、乾燥後溶媒を留去すると、2-(6-フェノキシ-3-ピリジル)プロピオン酸4.9gを得る。ヘキサン/エーテルより再結晶するとmp 2~3℃を示す。

実施例2

特開 昭50-77375(3)

必要に応じて、これを適当なアルカリ金属塩（例えば、ナトリウム、カリウムなど）、アルカリ土金属塩（例えば、カルシウム、マグネシウム、バリウムなど）、その他アルミニウム塩などに常法に従って変換することが可能である。

本発明の目的化合物であるピリジン誘導体およびそのγ-オキシド〔I〕ならびにその塩類は優れた抗炎症作用（抗リウマチ作用を含む）または鎮痛作用を示し、医薬またはその中間体として有用な化合物である。これらを医薬として使用するときは、錠剤、カプセル剤、粉剤などとしての経口投与または注射剤、坐薬などとしての非経口投与のいずれの方法も採用され得る。

以下実施例において本発明方法の実施態様を示す。

実施例1

エチル2-(6-クロロ-3-ピリジル)プロピオネート1.07g、フェノール5.2g、炭酸カリウム粉末5.0g、および酸化第二銅1.3gをピリジン100mlに加え、油浴中155℃で1.5時


フェノール1.0gおよび無水ジメチルホルムアミド10mlの混液に氷冷下5.3%水素化ナトリウム0.61gを加えかきまぜる。水素化ナトリウムが溶解後エチル2-(4-ニトロ-3-ピリジル)プロピオネートγ-オキシド2.4gを加え70~75℃で1時間かきまぜ、次いで溶媒を留去する。残渣に氷水を加えた後塩析し、クロロホルムで抽出する。抽出液を乾燥後溶媒を留去し残渣5.2gをメタノールに溶解し、ラニーニツケル1.2mlに2.5時間接触還元した後触媒を留去する。メタノールを留去後シリカゲルカラムクロマトに付し、ベンゼンおよびエーテル溶出部よりエチル2-(4-フェノキシ-3-ピリジル)プロピオネート1.6gを得る。

本品を20%水酸化カリウム水溶液5.5mlおよびエタノール5.5mlの混液に溶解し、室温で3時間かきまぜた後エタノールを留去する。残渣を水に溶解し、塩酸々性とした後炭酸水素ナトリウムでアルカリ性としクロロホルムおよびエーテルで洗滌する。脱色炭処理後塩酸でpH3とし析出する結晶

を浮取する。エーテルより再結晶し、 45°C / 6°C の 2-(α -フェノキシ- β -ピリジル)プロピオン酸を得る。

実施例 3-77

実施例ノと同様に反応処理し下記の化合物を得る。



(以下余白)

実施例 No.	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	-A-	X ₁	X ₂	R	融点 ($^{\circ}\text{C}$)
1	H	H	H	H	2-0	H	H	H	93-94d
2	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	H	153-153d
3	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	119-120d
4	H	H	H	H	2-0	H	H	Me	98-99d
5	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	H	123-124d
6	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	H	135-136d
7	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	107.5-108.5d
8	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	98-99d
9	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	110-111
10	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	94-95
11	H	H	H	H	2-0	H	H	Me	114-115
12	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
13	H	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
14	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
15	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
16	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
17	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
18	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
19	H	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
20	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
21	H	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
22	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
23	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
24	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
25	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
26	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
27	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
28	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
29	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
30	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
31	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
32	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
33	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
34	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136
35	C_6H_5	H	H	H	2-0	H	H	Me	135-136

実施例 No.	I_1	I_2	I_3	$-A-$	I_1	I_2	I_3	$-CH_2CH_2-$ の位置	R	η (°C)
34	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	4	Me	113~116A
37	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	4	Me	123~135A
38	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	4	Me	143~145A
39	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	4	Me	136~137A
40	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	4	Me	204~205A
41	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	119~120
42	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	4	Me	139~137A
43	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	120~121
44	H	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	133~131A
45	H	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	133~131A
46	H	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	93~93
47	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
48	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
49	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
50	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
51	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
52	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
53	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
54	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
55	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
56	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
57	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
58	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
59	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
60	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
61	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
62	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
63	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
64	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
65	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
66	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
67	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
68	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
69	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
70	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
71	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
72	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
73	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
74	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
75	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
76	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
77	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
78	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97
79	$\phi-NO_2$	H	H	2-0	H	H	H	3	Me	96~97

実施例 No.	I_1	I_2	I_3	$-A-$	I_1	I_2	I_3	$-CH_2CH_2-$ の位置	R	η (°C)
49	$2,3-(CH_3)_2$	H	H	4-0	H	H	H	3	Me	145~144
70	$2,4-(CH_3)_2$	H	H	4-0	H	H	H	3	Me	120.5~121.5
71	$2,5-(CH_3)_2$	H	H	4-0	H	H	H	3	Me	111~112
72	$2,6-(CH_3)_2$	H	H	4-0	H	H	H	3	Me	114~115
73	$2,7-(CH_3)_2$	H	H	4-0	H	H	H	3	Me	121.6~121.7
74	$2,8-(CH_3)_2$	H	H	4-0	H	H	H	3	Me	123~123
75	$2,9-(CH_3)_2$	H	H	4-0	H	H	H	3	Me	111~112
76	$2,10-(CH_3)_2$	H	H	4-0	H	H	H	3	Me	121.5~121.5
77	$2,11-(CH_3)_2$	H	H	4-0	H	H	H	3	Me	121.5~121.5
78	$2,12-(CH_3)_2$	H	H	4-0	H	H	H	3	Me	121.5~121.5
79	$2,13-(CH_3)_2$	H	H	4-0	H	H	H	3	Me	121.5~121.5

Me: ϕ -HCOOEt Me': ϕ -HCOAN

上記表で用いられる番号は下記の意味を表わす。

Me: ϕ -HCOOEt Me': ϕ -HCOAN
 100-20: イソブチル基 An: アニリン基
 0-20: カルボキシ基 An': アニリン基の分解点

(以下空白)

なお、 Y_1 、 Y_2 および Y_3 の例は α -Cl とはベンゼン環の α 位をクロル基が置換していることを表わし、同様に X_1 および X_2 類ではピリジン環上の置換基を表わす。 $-A-$ 類においては例えば $2-0$ はピリジン環の 2 位がエーテル結合していることを表わす。

実施例 80-82

接触還元工程を除いてはすべて実施例 2 と同様に反応操作し下記の化合物を得る。

2-(6-フェノキシ-3-ピリジル)プロピオン酸 γ -オキシド、 $m.p. 171 \sim 173^\circ C$ 。

2-(2-フェノキシ-4-ピリジル)プロピオン酸 γ -オキシド、 $m.p. 100 \sim 101^\circ C$ (分解)。

2-(6-(4-クロルフェノキシ)-3-ピリジル)プロピオン酸 γ -オキシド、 $m.p. 86 \sim 87^\circ C$ 。

特許出願人 塩野義製薬株式会社

代理人 弁護士 岩崎 光雄

手続補正書

(特許法第 177 条第 1 項第 1 号)

昭和 48 年 2 月 1 日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示 昭和 48 年特許願第 125,535 号

2. 発明の名称

ピリジン誘導体の炭化

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 大阪府大阪市東区道修町 3 丁目 1 番地

名称 (192) 塩野義製薬株式会社

代表者 吉 利 一 雄

4. 代理人

住所 大阪府福島区豊洲上 2 丁目 4 番地

塩野義製薬株式会社特許部

(電話 06-458-5861)

氏名 弁護士 (4703) 岩崎 光雄

委任状理由通知の日付 昭和 48 年 1 月 1 日 (発給日)

前記以外の発明者

特願 昭 50-77375 (K)

ケンワレ ヒロシタカサコ
大阪府岸和田市東ヶ丘町 808 の 55
ヒロセ カツミ
広 瀬 勝 己

5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄

6. 補正の内容

(1) 明細書第 1 頁末行の次に下記の文を挿入する。

「注：上記表中のカルシウム塩は実施例 22 のものが水和物、実施例 21 が水和物、実施例 30 および 31 が水和物、実施例 59、66、69、73 および 78 が水和物、実施例 14、15、29、33、57 および 58 が水和物であり、実施例 32 および 34 のものが水和物である。」

以 上

昭 55 6.14 発

手 続 補 正

（意見書に代えて）



昭和55年3月12日

特許庁長官 殿

1.事件の表示 昭和48年特許願第 128453 号

2.発明の名称

ピリジン誘導体の製法

3.補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 大阪府大阪市東区道修町3丁目12番地

名称 (192) 塩野義製薬株式会社

代表者 吉 利 一 雄

4.代 理 人

住所 大阪市福島区豊洲5丁目12番4号

塩野義製薬株式会社特許部

(電話06-458-5861)

氏名 弁護士(6703) 岩 崎 光 雄

5.拒絶理由通知の日付 昭和 年 月 日(発注日)



特許法第17条の2による補正の掲載
昭和 48 年特許願第 128453 号(特開昭
50-77375号 昭和50年6月24日
発行公開特許公報 50-774 号掲載)につ
いては特許法第17条の2による補正があったので
下記の通り掲載する。

Int. Cl.	識別 記号	庁内整理番号
C07D213/62		7138 4c
213/89		7138 4c
215/20		7306 4c
215/36		7306 4c
11 AB1K 31/44		6617 4c
31/47		6617 4c



5.補正の対象

明細書の「特許請求の範囲」および「発明の詳細な説明」の欄。

6.補正の内容

(1)特許請求の範囲を別紙のとおり訂正する。

(2)明細書6頁7行目の「ベンゼン環が置換として例えば」を「ベンゼン環が、また置換としては例えば」に訂正する。

(3)同書15頁下から3行目と2行目の間に下記の文を挿入する。

「実施例53-59

実施例1と同様に反応操作し、下記の化合物を得る。

2-[6-(4-ヒドロキシフェノキシ)-3-ピリジル]プロピオン酸、mp 67~69℃
2-[6-(4-アセチルオキシフェノキシ)-3-ピリジル]プロピオン酸、161~162℃

2-[6-(4-イソプロピルフェノキシ)-3-ピリジル]プロピオン酸、89~91℃


2-[6-(4-プロピルフェノキシ)-3-ピリジル]プロピオン酸、mp 15~17.5℃
2-[6-(4-tert-ブチルフェノキシ)-3-ピリジル]プロピオン酸、mp 12~13℃
2-[6-(4-tert-ブチルフェノキシ)-3-ピリジル]プロピオン酸、mp 67~71℃
2-[6-(2-イソブチルフェノキシ)-3-ピリジル]プロピオン酸カルシウム、114~119℃(分解)

以 上

(別紙)


2特許請求の範囲

一般式



〔式中、X₁およびX₂はそれぞれ水素、アルキル基または両者が結合して形成する環環もしくは芳香環を置き、Wはハロゲンまたは2位もしくは4位を置換するニトロ基を置き、Zは加水分解によりCH₂COOH(但しRは水素またはアルキル基を置き、)になる基を置き、)で示される化合物またはそのN-オキソドに

一般式




〔式中、Aは酸素または硫黄を置き、Y₁, Y₂, およびY₃はそれぞれ水素、アルキル基、アルコキ

シ基、カルバモイル基、カルボキシル基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、トリフルオロメチル基、水酸基、アシルオキシ基、アシルアミノ基またはハロゲンを置き、これらの任意の置換基は結合して環環または芳香環を形成してもよい。〕

で示される化合物を反応させて

一般式



〔式中、X₁, X₂, Y₁, Y₂, Y₃, AおよびZは前記と同意義を置き、)で示される化合物またはそのN-オキソドを得るかあるいは必要に応じて加水分解に付して対応するカルボン酸を得ることを特徴とするピリジン誘導体の製法。

(以上)